

Meetprotocol voor ergotherapeuten

Algemene meetinstrumenten

Zie het [meetprotocol](#) voor de algemene meetinstrumenten

Beroep specifieke meetinstrumenten voor ergotherapeuten

Naast de algemene meetinstrumenten die de patiënt zelf zal invullen in de app, zijn er beroep specifieke meetinstrumenten die worden afgenomen door ergotherapeuten of ook door de patiënt en/of mantelzorger worden ingevuld. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van deze meetinstrumenten en het tijdstip waarop deze worden afgenomen. Verderop in dit document vindt u een korte uitleg en een link voor ieder meetinstrument.

Domein	Ergotherapie	In te vullen door		Meetprotocol		
		Patiënt/ naaste	Ergo	Intake	Einde	Na 12 mnd
Activiteiten	Canadian Occupational Performance Measure (COPM)		X	X	X	X ¹
Functioneren	Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) *		X	X	X	
Functioneren	PRPP*		X	X	X	
Activiteiten	PRO-ergo	X		X	X	X
Cognitief functioneren	Cognitive Complaints – Participation (CoCo-P) **	X		X	X	X

*Indien de ergotherapeut niet geschoold is in AMPS, dan graag de PRPP afnemen. De ergotherapeut hoeft dus niet allebei in te vullen. Als de ergotherapeut in beide meetinstrument niet geschoold is, dan hoeft de ergotherapeut niets in te vullen.

**Dit meetinstrument is onderverdeeld in een patiënt versie en een naaste versie, beide moeten worden ingevuld in app van de patiënt, het patiënten portaal.

¹ na 12 maanden wordt de COPM afgenomen door de onderzoekers in plaats van de ergotherapeut

Activiteiten

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) begin ± 60 min; eind ± 15 min)

De COPM wordt door de ergotherapeut en patiënt samen ingevuld via het portaal van de behandelaar, zowel aan het begin als aan het eind van de ergotherapie interventie. 12 maanden na de start van de ergotherapie interventie zal de onderzoeker de patiënt telefonisch vragen om de uitvoering en tevredenheid opnieuw te scoren voor de problemen die aan het begin van de interventie zijn vastgesteld. De COPM wordt gebruikt om samen behandeldoelen op te stellen. De belangrijkste problemen die door de patiënt worden ervaren, worden met de COPM vastgesteld. Op basis hiervan worden doelen opgesteld.

Meetinstrument: zie [website](#)

Toelichting: zie [PDF](#)

Voor praktische informatie ergotherapie en COVID-19: zie [website](#)

*Functioneren***Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) begin & eind: ± 60 – 120 min (afname + verwerking scoring)**

De AMPS is een secundaire uitkomstmaat voor het onderzoek. Afname van de AMPS (alleen indien de ergotherapeut hierin is geschoold) stellen wij zeer op prijs, maar dit is niet verplicht. De AMPS eindscore wordt aan het begin en aan het eind van de interventie ingevuld in het portaal van de behandelaar.

De AMPS wordt gebruikt om het functioneren van de patiënt te evalueren middels observatie van alledaagse dagelijkse taken. Er zijn ook activiteiten opgenomen, zoals een maaltijd koken. Er wordt gekeken naar de mate van motorische en procesvaardigheden van het uitvoeren van een taak en of een taak veilig, zelfstandig en efficiënt wordt uitgevoerd. De eindscore voor motorische vaardigheden en voor procesvaardigheden wordt ingevuld in het portaal van de behandelaar.

Meetinstrument: zie [PDF](#)

Toelichting: zie [PDF](#)

*Functioneren***PRPP ± 60 – 120 min (afname + verwerking scoring)**

De PRPP is een alternatief indien de ergotherapeut niet geschoold is in de AMPS en wél geschoold is in de PRPP. Deze wordt in dat geval aan het begin en aan het eind van de ergotherapie interventie ingevuld. De PRPP is eveneens een secundaire uitkomstmaat voor het onderzoek. Afname van de PRPP stellen wij zeer op prijs maar is niet verplicht. De eindscore (%) wordt door de ergotherapeut ingevuld in het portaal voor de behandelaar.

De PRPP is een observatie instrument dat gebruikt kan worden bij verdenking op problemen van informatieverwerking. Routines, taken en subtaken worden in kaart gebracht aan de hand van een observatie van taken. Met de PRPP worden problemen in processen van informatieverwerking benoemd, verklaard en begrepen.

PRPP staat voor:

P: Perceive (= waarnemen)

R: Recall (= herinneren)

P: Plan (= plannen)

P: Perform (= uitvoeren)

Meetinstrument: zie [website](#)

*Activiteiten***PRO-ergo begin & eind ± 10 min**

De patiënt vult zelf de PRO-ergo vragenlijst in via het eigen patiënten portaal. Deze wordt aan het begin en aan het eind van de ergotherapie interventie ingevuld en na 12 maanden. De patiënt wordt aan het begin en vlak vóór de afronding van de ergotherapie interventie herinnerd door de ergotherapeut om de PRO-Ergo vragenlijst via het patiënten portaal in te vullen. Na 12 maanden wordt de patiënt hieraan herinnerd door de app. De onderzoeker contact met de patiënt op wanneer dit niet binnen een week is gedaan.

De PRO-ergo wordt gebruikt om te meten wat de ergotherapie interventie heeft opgeleverd.

Meetinstrument: zie [website](#)

Cognitive Complaints – Participation (CoCo-P) begin & eind: ± 20 min

De CoCo-P wordt aan het begin en aan het eind van de ergotherapie interventie en na 12 maanden door de patiënt ingevuld. De ergotherapeut herinnert de patiënt hieraan vóór de start van en aan het einde van de ergotherapie interventie. Na 12 maanden na start van de interventie wordt de patiënt hieraan herinnerd door de app. De onderzoeker neemt contact met de patiënt op wanneer dit niet binnen een week is gedaan.

De CoCo-P Patient

De CoCo-P wordt gebruikt om problemen vast te stellen die mogelijk ontstaan zijn op het gebied van cognitief functioneren. Het hebben van problemen met bijvoorbeeld het concentreren of onthouden, kunnen gevolgen hebben voor de dagelijkse activiteiten. Deze vragenlijst geeft inzicht in de klachten die een patiënt ervaart en hoe deze de uitvoering van activiteiten beïnvloedt.

Als de patiënt het lastig vindt om de vragenlijst in te vullen, dan kan hij of zij dit samen met een naaste (familielid of goede vriend) doen.

Meetinstrument: zie [website](#)

CoCo-P Naaste

De CoCo-P Naaste wordt ook aan het begin en aan het eind van de ergotherapie interventie en na 12 maanden door de naaste ingevuld in het patiënten portaal.

De ergotherapeut herinnert de naaste hieraan vóór de start van en aan het einde van de ergotherapie interventie. De naaste wordt na 12 maanden hieraan herinnerd door de app van de patiënt. De onderzoeker neemt contact met de naaste van de patiënt op wanneer dit niet binnen een week is gedaan.

Deze vragenlijst geeft inzicht in de ervaren klachten van de naaste van cliënt. Een naaste kan zijn de partner, kind, ander familielid, vriend(in) of andere nauw betrokken persoon zijn.

Meetinstrument: zie [PDF](#)